

Số: 1237/TB-SNNPTNT

Hậu Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc xuống giống lúa vụ Thu Đông năm 2020

Vụ lúa Hè Thu 2020 đến nay xuống giống được 71.145,7 ha/76.700 ha đạt 92,75% so với kế hoạch. Do ảnh hưởng của hạn, mặn nên lịch gieo sạ lúa Hè Thu giữa các huyện, thị, thành không tập trung đồng loạt, phân bố thời gian kéo dài. Một số địa phương không bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn nên chủ động gieo sạ sớm hiện nay nông dân đã bắt đầu thu hoạch lúa Hè Thu.

Trước tình hình thực tế trên, để đảm bảo nhu cầu sản xuất lúa của nông dân, mùa vụ và giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh về sau, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thời gian xuống giống lúa Thu Đông năm 2020 như sau:

1. Thời điểm xuống giống

Đợt 1: Từ ngày 08 - 16/6/2020 (tức ngày 17 - 25/4 âm lịch).

Đợt 2: Từ ngày 02 - 10/7/2020 (tức ngày 12 - 20/5 âm lịch).

Đợt 3: Từ ngày 30/7 - 07/8/2020 (tức ngày mùng 10 - 18/6 âm lịch)

Lưu ý: Lúa Thu Đông đối với một số vùng xuống giống trễ cần kết thúc trước ngày 31/8/2020.

Hiện nay diện tích lúa Hè Thu sạ sớm tại các huyện như Châu Thành A, Vị Thủy đã thu hoạch nông dân có thể xuống giống trong đợt 1 nhưng cần lưu ý tuân thủ thời điểm xuống giống để né rầy nâu di trú.

Đối với diện tích lúa Hè Thu thu hoạch muộn có thể xuống giống ở khu vực có hệ thống đê bao kiên cố, điều kiện thoát nước tốt, chủ động bơm tạt để hạn chế nước lũ gây ngập úng.

Tùy theo tình hình rầy nâu di trú vào đền tại địa phương và tình hình thực tế về thời tiết, thủy văn; từng địa phương theo dõi để quyết định thời gian xuống giống lúa Thu Đông cho hợp lý.

Bên cạnh đó, mùa mưa năm 2020 diễn biến rất phức tạp, nông dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão khi quyết định xuống giống.

2. Một số biện pháp cần áp dụng

- Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu cần vệ sinh kỹ đồng ruộng, cày vùi rơm rạ ngay và đảm bảo thời gian cách ly ít nhất 20 ngày trước khi gieo sạ để tránh ngộ độc hữu cơ. Có thể sử dụng nấm *Trichoderma* để phân hủy rơm rạ nhằm hạn chế thối rễ cho lúa.

- Sử dụng giống thích nghi mùa vụ, giống xác nhận, sạ thưa, sạ hàng với lượng giống <100 kg/ha hoặc cây. Kết hợp đánh nhiều rãnh thoát nước để hạn chế ngập, úng.

- Có thể sử dụng một số giống có khả năng chống chịu trong điều kiện bất lợi do thời tiết ở vụ Thu Đông như: OM5451, OM6976, OM2517, OM 4900, OM18...

- Áp dụng các quy trình canh tác lúa tiên tiến như 3 Giảm 3 Tăng, 1 Phải 5 Giảm, ứng dụng Công nghệ sinh thái trong quản lý dịch hại tổng hợp.

- Xuống giống tập trung, đồng loạt trên từng cánh đồng, né rầy để hạn chế bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá xảy ra.

- Sau khi gieo sạ nếu rầy di trú vào ruộng thì đưa nước vào ngập “chẳng ba” cây lúa để hạn chế rầy nâu chích hút và đẻ trứng.

- Hạn chế phun thuốc trừ sâu sớm trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây lúa nhất là đối với trà lúa dưới 40 ngày sau sạ để bảo tồn thiên địch, tránh sinh vật gây hại bộc phát ở giai đoạn sau.

Hiện nay, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá còn diễn biến rất phức tạp, bà con nông dân nên tuân thủ lịch xuống giống của địa phương, không được nóng vội xuống giống lúa vụ Thu Đông do khả năng rầy nâu di cư với mật số cao từ lúa Hè Thu đang thu hoạch./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT và BVTV, TTKN;
- Phòng NN/Phòng Kinh tế các huyện, thị, thành;
- Trạm TT và BVTV các huyện, thị, thành;
- Đài PTTH, Báo Hậu Giang;
- Lưu: VT, CCTTBVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**